

WIJZIGINGEN DRAAIBOEK INFECTIEZIEKTEN 2023

Sinds oude versie draaiboek 2010

	STAP	OUD DRAAIBOEK	NIEUW DRAAIBOEK
Shigella	Wering van school	Kleuters en kinderen met vergelijkbare ontwikkelingsleeftijd tot 2 negatieve faecesculturen afgenomen met minstens 24u tussen	Kleuters en kinderen met vergelijkbare ontwikkelingsleeftijd tot 1 negatieve faecescultuur
STEC	Algemeen	EHEC	STEC = Shiga-toxine producerende <i>E. coli</i>
	Contactopsporing	Niet gespecificeerd	Diarree bij contactpersonen faecesonderzoek kan aangewezen zijn -> overleg team infectieziektebestrijding
	Wering van school	Wering tot 2 negatieve faecesstalen met minstens 24u tussen	Geen wering voor kinderen met goed hygiënebesef die klachtenvrij zijn. Voor kleuters en kinderen met vergelijkbare ontwikkelingsleeftijd wering tot 2 negatieve faecesstalen met minstens 24u tussen en klachtenvrij
Buiktyfus	Wering van school	<ul style="list-style-type: none"> Kleuters en kinderen met verstandelijke beperking: duur van de wering in overleg met team infectieziektebestrijding Wering broers en zussen met diarree tot negatieve cultuur 	<ul style="list-style-type: none"> Kleuters en kinderen met vergelijkbare ontwikkelingsleeftijd: wering tot 3 negatieve faecesculturen met minstens 1 dag interval, afgenomen minstens 3 weken na de laatste koortsdag én minstens 2 weken na het beëindigen van de antibioticakuur. Wering broers en zussen met diarree: indien voldoende hygiënebesef tot klinisch herstel, voor kleuters en kinderen met vergelijkbare ontwikkelingsleeftijd tot negatieve faecescultuur.

	STAP	OUD DRAAIBOEK	NIEUW DRAAIBOEK
Gastro-enteritis	Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> Gezamenlijke richtlijn gastro-enteritis en voedselinfectie Aparte richtlijnen per ziektekiem (<i>Campylobacter</i> spp, rotavirus, calicivirus, non-typhoidale <i>Salmonella</i>, <i>Giardia lamblia</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Aparte richtlijnen gastro-enteritis en voedselinfectie Geen aparte richtlijn per ziektekiem (<i>Shigella</i> spp, STEC en buiktyfus blijven wel apart)
	Vraagverheldering en meldingsplicht	Vanaf 2 gevallen binnen de week in 1 klasgroep melden bij team infectieziektebestrijding	<p>Ga vanaf 2 gevallen steeds na of het kan voedselgerelateerd zijn. Zo ja, ga naar richtlijn Voedselinfectie.</p> <p>Vanaf meer dan 2 gevallen binnen de week in 1 klasgroep én er is minstens één kiemidentificatie omwille van de ernst van de infectie -> melden bij team infectieziektebestrijding</p>
Voedselinfectie	Contactopsporing	Niet gespecificeerd	Alle personen die hetzelfde voedsel hebben ingenomen zijn contactpersonen
HBV	Contactopsporing	Contactopsporing beschreven	Contactopsporing niet van toepassing in schoolcontext aangezien besmettingsweg seksueel, verticale transmissie, gedeeld intraveneuze naaldgebruik

